

INDIKATORERKRANKUNG ZUM ZEITPUNKT		DER DIAGNOSE:	DES TODES:		
rezid. bakt. Infektionen (Kinder)	☐	1	☐	eine oder mehrere INDIKATORERKRANKUNGEN ankreuzen	
Candidiasis der Bronchien, Trachea, Lunge	☐	2	☐		
Candidiasis des Oesophagus	☐	3	☐		
Kokzidioidomykose	☐	4	☐		
Kryptokokkose, extrapulmonal	☐	5	☐		
Kryptosporidiose (Durchfall > 1 Monat)	☐	6	☐		
Zytomegalievirus	☐	7	☐		
Zytomegalie-Retinitis	☐	8	☐		
Herpes-simplex	☐	9	☐		
Histoplasmose	☐	10	☐		
Isosporiasis	☐	11	☐	T4 (CD4) ZELLEN	
Mykobakterium avium complex, M.kansasii	☐	12	☐	bei Diagnose	bei Tod
Mykobakterium tuberculosis pulmonal	☐	13	☐		
Mykobakterium tuberculosis extrapulmonal	☐	14	☐	T4/T8 RATIO	
Mykobakterium: andere, nicht differenziert	☐	15	☐	bei Diagnose	bei Tod
Pneumozystis Carinii Pneumonie	☐	16	☐		
rezidivierende Pneumonien	☐	17	☐		
progr. multifok. Leukenzephalopathie	☐	18	☐		
Salmonellasepsis	☐	19	☐		
Toxoplasmose des Gehirns	☐	20	☐		
invasives Zervixkarzinom	☐	21	☐	ANTIRETROVIRALE THERAPIE	
HIV-Enzephalopathie	☐	22	☐	☐	ja
Kaposi-Sarkom	☐	23	☐	☐	nein
lymphoide interst. Pneumonie (Kinder)	☐	24	☐	☐	unbekannt
Lymphom, Burkitt oder analog	☐	25	☐		
Lymphom, immunoblastisch	☐	26	☐		
Lymphom, primär des Gehirns	☐	27	☐		
HIV-Auszehrungssyndrom	☐	28	☐		
Opportunistischer Infekt, nicht definiert	☐	30	☐		
Lymphom, nicht definiert	☐	31	☐		

Bitte zurücksenden an:

Abteilung VII/11 - Übertragbare Krankheiten und Seuchenbekämpfung

Bundesministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Radetzkystraße 2
1030 Wien

E-Mail: SVII.11@gesundheitsministerium.gv.at

ÜBERTRAGUNGSRISIKO

homo/bisexuell	☐	1
IV-Drogenkonsum	☐	2
homo / bisexuell + IV-Drogenkonsum	☐	3
hämothil / Gerinnungsstörung	☐	4
Transfusionsempfänger	☐	5
heterosexuelle Übertragung	☐	6
Mutter zu Kind Übertragung	☐	7
nosokomiale Infektion	☐	8
sonstiges / unbekanntes Risiko	☐	9

Risiko des Partners (nur ausfüllen bei heterosexueller Übertragung)

☐	Patient kommt aus Region mit häufiger heterosexueller Übertragung
☐	Partner bisexueller Mann
☐	Partner IV-Drogengebraucher
☐	Partner haemophil oder Transfusionsempfänger
☐	Partner kommt aus Land mit häufiger heterosexueller Übertragung
☐	Partner bekannt positiv, jedoch nicht Gruppe 2 - 5
☐	Partner unbekannt, heterosexuelle Übertragung wahrscheinlich

Risiko der Mutter (nur ausfüllen bei Mutter zu Kind Übertragung)

☐	Mutter IV-drogenabhängig
☐	Mutter kommt aus Region mit häufiger heterosexueller Übertragung
☐	Mutter mit heterosexueller Infektion, jedoch nicht Gruppe 2
☐	Mutter Transfusionsempfängerin
☐	Mutter anderes oder unbekanntes Risiko